

	BULLETIN CLIMATIQUE	Réf : ANAM/PDC/PR_03/RA_01/V00
		Date: 29/10/2024
	MENSUEL	Page 1 sur 5



No 2 période du 01 au 31 Août 2025

SYNTHÈSE DU MOIS

Plusieurs épisodes pluvieux et orageux ont été enregistrés ce mois-ci. Les précipitations ont été excédentaires sur la majeure partie du pays. Le cumul mensuel le plus élevé (**474,0 mm**) a été enregistré à Sindou, et la hauteur journalière maximale (96.2 mm), a été mesurée le 22 août à Namounou.

Dans l'ensemble, une tendance à la fraîcheur a dominé au cours du mois d'août sur la majeure partie du pays, en comparaison à la normale climatologique 1991–2020.

Les températures maximales étaient toutes en baisse tandis que les températures minimales ont connu une légère hausse dans certaines villes. La minimale absolue (19,6 °C) a été enregistrée à le 28 août à Bobo-Dioulasso, et la maximale absolue (34,0 °C) à Ouagadougou le 06 août.

AOÛT 2025

Sommaire

- Précipitations
- Températures
- Synthèse des valeurs extrêmes

Précipitations

Les précipitations cumulées au cours du mois d'août 2025 ont varié globalement entre 90 mm et plus de 450 mm selon les régions. Les cumuls les plus élevés (≥ 340 mm) ont été enregistrés à Sindou (474,0 mm) en 12 jours, Namounou (423,7 mm), Bérégadougou (404,8 mm), Gourcy (392,5 mm), Tenkodogo (382,7 mm) et Mané (348,8 mm). À l'inverse, des cumuls pluviométriques nettement plus faibles ont été observés dans certaines localités, notamment à Gaoua (89,3 mm), Batié (130,7 mm) et Boussé (167,5 mm) (Figure 1).

L'analyse de l'anomalie relative des cumuls de pluie par rapport à la normale (1991-2020) révèle des écarts positifs dans plusieurs localités (Figure 2), indiquant que dans une grande partie du pays, les précipitations ont été supérieures à la normale en août 2025. Dans certaines localités des régions du Yaadga (Gourcy), du Nakambé (Tenkodogo), du Tannounyan (Sindou) et du Kuilsé (Mané, Kongoussi), des excédents pluviométriques pouvant atteindre +50 % ont été enregistrés. En revanche, des déficits marqués ont été observés dans le Djôrô (Gaoua,



BULLETIN CLIMATIQUE

Réf : ANAM/PDC/PR_03/RA_01/V00

Date: 29/10/2024

MENSUEL

Page 2 sur 5

Batié), avec des baisses allant jusqu'à -62 %. D'autres déficits ont également été relevés dans certaines localités du Guiriko et du Nazinon (Figure 2).

Sur les neuf stations synoptiques, cinq ont enregistré des cumuls pluviométriques supérieurs à la normale, et cinq ont reçu des précipitations plus abondantes qu'en août 2024 (Figure 3).




Figure 1 : Répartition spatiale des cumuls mensuels de août 2025



Figure 2 : Répartition spatiale des écarts par rapport à la normale 1991-2020




Figure 3 : Cumuls mensuels d'août 2025 comparés à ceux de l'année 2024 et à la normale 1991-2020

Températures

Températures moyennes





Figure 4 : Répartition spatiale de la température moyenne de d'août 2025

En août 2025, les températures moyennes ont varié de 28,3 °C à Boulbi à 24,1 °C à Koumbia (figure 4). Les valeurs les plus basses ont été enregistrées dans le Sud-Ouest et le Centre-Ouest (Banfora, Bobo-Dioulasso, Gaoua, Léo), tandis que les plus élevées, supérieures à 27,0 °C, ont concerné certaines parties du Kadiogo et du Liptako. Dans l'ensemble, une tendance à la fraîcheur a dominé sur la majeure partie du pays, en comparaison à la normale climatologique 1991–2020.

Avec une moyenne sur le pays de **26,2 °C**, août 2025 a été plus frais que d'habitude : **0,6 °C de moins que la normale** (26,8 °C) et **0,7 °C de moins qu'en août 2024** (26,9 °C).

Températures maximales

Les températures maximales moyennes du mois d'août ont varié de 29,2 °C à Bobo-Dioulasso à 31,6 °C à Ouagadougou. De manière générale, elles ont été inférieures à la moyenne climatologique 1991–2020 excepté à Ouagadougou, Fada N'Gourma et Bogandé. Les écarts ont oscillé de -1.1 °C à Gaoua à +0.2°C à Ouagadougou (Figure 5). Ouagadougou a enregistré le 06 août, la température maximale journalière la plus élevée du pays avec 34,0 °C.




Figures 5 : Ecart des températures maximales à la normale (1991-2020)

Températures minimales

En ce qui concerne les températures minimales moyennes, elles ont varié entre 21,6 °C à Bobo-Dioulasso et 22,9 °C à Fada N’Gourma et Bogandé.

Ces températures ont été supérieures ou égale à la normale 1991–2020 à Fada N’Gourma, Gaoua, Boromo et Dédougou et en dessous de la moyenne sur le reste des stations. Les écarts ont fluctué entre –0,4 °C à Bogandé et +0,3 °C à Fada N’Gourma (Figure 6). La température minimale journalière la plus basse du mois, soit 19,6 °C, a été enregistrée à Bobo-Dioulasso le 28 août.



Figures 6 : Ecart des températures minimales à la normale (1991-2020)

Synthèse des valeurs extrêmes mensuelles

Tableau 1 : valeurs extrêmes des températures et des précipitations en août 2025

TEMPERATURES					PRECIPITATIONS		
Stations	Tmax absolue du mois	Date	Tmin absolue du mois	Date	Stations	Pluie max en 24h	Date
Bobo-Dioulasso	31.7	28/08	19.6	23/08	Namounou	96.2	15/08
Bogandé	33.8	06/08	19.8	10/08	Bilanga	92.2	01/08
Boromo	33.1	29/08	20.2	21/08	Diapaga	79.0	13/08
Dédougou	33.4	29/08	20.2	21/08	Tiébéélé	70,5	07/08
Fada N’Gourma	33.8	03/08	20.4	21/08	Banfora	67,3	28/08
Gaoua	31.8	28/08	20.4	04/08	Farakoba	60,7	15/08
Ouagadougou	34.0	06/08	20.4	21/08	Gourcy	60.4	30/08
Ouahigouya	33.3	29/08	20.4	10/08	Pama	60.1	22/08
Po	32.5	29/08	19.7	04/08	Meguet	57.0	26/07

	BULLETIN CLIMATIQUE	Réf : ANAM/PDC/PR_03/RA_01/V00
		Date: 29/10/2024
	MENSUEL	Page 5 sur 5

Source : ANAM, 2025



Normale : La normale est la valeur moyenne d’une variable météorologique, pour une période bien déterminée, idéalement de 30 ans, calculée sur base des observations effectuées sur cette période.