

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_11/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	PREVISIONS SAISONNIERES DES PARAMETRES AGROCLIMATIQUES 2026 (Mise à jour de Juillet)	Page : 1/3

I. Synthèse de la situation pluviométrique du 1^{er} avril au 30 juin 2026

Les cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 30 juin 2026 ont évolué entre 33 **mm** en **dix** (10) jours de pluie à Arbinda (Karo Peli) et 343 **mm** en dix-sept (17) jours de pluie à Bagassi (Balé) (annexes 1a ,1b).

Les cumuls pluviométriques les plus élevés ont été enregistrés dans les régions des Tannounyan, du Bankui, du Djôrô et du Guiriko (annexes 1a, 1b).

Les localités ayant reçu une faible pluviométrie sont situées principalement dans des localités du Soum, du Liptako, de Yaadga, des Koulsé et de Oubri (annexes 1a ,1b).

II. Analyse comparative de la situation pluviométrique actuelle par rapport à celle de l'année 2025 et à la normale pluviométrique (moyenne 1991 – 2020).

Les cumuls pluviométriques saisonniers enregistrés du 1^{er} avril au 30 juin 2026 ont été globalement similaires à déficitaires sur la moitié ouest du pays et similaire à excédentaires sur la moitié est par rapport à ceux de la même période en 2025. Les excédents les plus marqués sont observés dans les régions de la Sirba, du Gourma, de la Tapoa, ainsi que par endroits dans le Bankui et le Nazinon. En revanche, des déficits pluviométriques sont relevés, principalement dans les régions du Nando,

	BULLETIN		Réf : ANAM/PAM/PR_11/BN_01/V00
			Date : 29 octobre 2024
	PREVISIONS SAISONNIERES DES PARAMETRES AGROCLIMATIQUES 2026 (Mise à jour de Juillet)		Page : 2/3

du Nakambé, des Tannounyan, du Guiriko, du Bankui, de Oubri, du Nazinon et des Koulsé. (annexes 2 et 4).

Comparés à 2025, les hausses pluviométriques les plus importantes ont été observées à Kantchari **(+165 mm)**, à Matiacoali **(+140 mm)**, à Fada N’Gourma **(+114 mm)**, à Bagassi **(+88 mm)**, à Pompoï **(+74 mm)**, à Boromo **(+70 mm)**, à Bogandé **(+68 mm)** et à Ouagadougou **(+50 mm)** (annexes 2 et 4).


Par contre, d’importantes baisses pluviométriques ont été enregistrées dans plusieurs localités, notamment à Bobo-Dioulasso **(-152 mm)**, à Safané **(-120 mm)**, à To **(-118 mm)**, à Bama **(-113 mm)**, à Ziga (Ziniaré) **(-88 mm)** et à Bérégadougou **(-84 mm)** (annexes 2 et 4).

Par rapport à la normale (moyenne 1991-2020), les cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 30 juin 2026 pour la même période ont été globalement normaux à déficitaires sur la majeure partie du pays. Cependant, des excédents ont été notés dans certaines localités, notamment dans les régions du Nando, du Bankui, des Koulsé, de la Tapoa, du Gourma, de la Sirba, des Tannounyan et du Kadiogo (annexes 3 et 4).


Les baisses importantes ont été relevées à Kampti **(-135 mm)**, à Baguéra **(-131 mm)**, à Gaoua **(-113 mm)**, à Sapouy **(-93 mm)**, à Loumana **(-93 mm)**, à Korsimoro **(-85 mm)**, à Pô **(-83 mm)**, à Dissin **(-82 mm)** et à Koumbia **(-79 mm)** (annexes 3 et 4).

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_11/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	PREVISIONS SAISONNIERES DES PARAMETRES AGROCLIMATIQUES 2026 (Mise à jour de Juillet)	Page : 3/3


Quant aux hausses pluviométriques par rapport à la moyenne 1991-2020, elles ont été relevées surtout à Réo **(+106 mm)**, à Bagassi **(+96 mm)**, à Sidéradougou **(+55 mm)**, à Banfora **(+53 mm)**, à Matiacoali **(+49 mm)**, à Boulsa **(+47 mm)** et à Kantchari **(+46 mm)** (annexes 3 et 4).




Annexe 1a : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 30 juin 2026



Annexe 1b : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 30 juin 2026



Annexe 2 : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 30 juin 2026 comparés à ceux de 2025



Annexe 3 : Cumuls pluviométriques saisonniers du 1^{er} avril au 30 juin 2026 comparés à la normale (moyenne 1991-2020)



METEO-Burkina (ANAM)
Chaine WhatsApp



<https://meteoburkina.bf/>



<https://facebook.com/meteoburkina>