



N°03 période du 21 au 31 janvier 2026

Dans ce numéro :		Sommaire : • Baisse modérée à importante des températures maximales • Baisse importante à modérée des Humidités relatives • Hausse importante des évaporations par rapport à la décade précédente • Baisse importante à modérée de la demande climatique prévue, temps essentiellement nuageux à couvert par moments • Fraicheur nocturne et matinale restera légèrement ressentie
Conditions climatiques de la décade	1	
Perspectives agrométéorologiques	2	
Besoins en eau de quelques cultures	4	
Avis et conseils agrométéorologiques	5	

Conditions climatique de la décade

Températures :

• Maximales : entre 32.1 °C à Titao (Loroum) et 37.3 °C à Sideradougou (Comoé). En baisse modérée à importante par rapport à la décade précédente sur la majeure partie du pays (Figure 1).




Figure 1 : Anomalie des températures maximales de la décade par rapport à la décade précédente

• Minimales : entre 12.6 °C à Bakata (Ziro) et 22.1 °C à Kompienga (Kompienga). En baisse modérée par rapport à la décade précédente sauf dans la moitié sud du pays où elles sont en variation légère (Figure 2).




Figure 2 : Anomalie des températures minimales de la décade par rapport à la décade précédente

Humidités relatives :

• Maximales : entre 16 % à Kindi (Boulkiemdé) et 82 % à Bama (Houet). En baisse importante par rapport à la

décade précédente sur la totalité du pays (Figure 3). !




Figure 3 : Anomalie des humidités maximales de la décade par rapport à la décade précédente

- Minimales : entre 04 % à Arbolé (Passoré) et 16 % à Pa (Balé). En baisse modérée à importante par rapport à la décade précédente sur l'ensemble du pays (Figure 4).




Figure 4 : Anomalie des humidités minimales de la décade par rapport à la décade précédente

Evapotranspiration potentielle : entre 57 mm à Bérégadougou (Comoé) et 80 mm à Dédougou (Mouhoun). En hausse importante par rapport à la décade précédente sur le pays (Figure 5).




Figure 5 : Anomalie de l'évapotranspiration de la décade par rapport à la décade précédente

Suivi de la végétation : La croissance végétative est globalement similaire à légère hausse par rapport à la moyenne 2003-2022 sur la majeure partie du territoire (Figure 6).




Figure 6 : Anomalie NDVI de la décade par rapport à la normale 2003-2022

Perspectives agrométéorologiques

Prévision de l'Evapotranspiration Potentielle

La demande climatique va présenter une baisse importante sur la majeure

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADAIRE	Page : 3/5

partie du pays par rapport à cette décade (Figure 7).




Figure 7 : Anomalie prévision de l'évapotranspiration de la décade par rapport à la décade précédente

Conditions météorologiques du 03 au 09 février 2026

- Vents : d'harmattan faibles à modérés sur l'ensemble du pays, avec par moments, des vents relativement forts
- ciel essentiellement nuageux à couvert avec par moments des éclaircis
- visibilité et qualité de l'air resteront bonnes dans l'ensemble, mais pourraient être réduites par la poussière en suspension dans les régions de la Tapoa, du Goulmou, du Liptako et du Yaadga ainsi que dans les grandes villes aux heures de pointes.
- **Fraicheur nocturne et matinale légèrement ressentie**

- Températures : Minimales : 22°C à 25°C ; Maximales : 36°C à 40°C.

Situation agricole

Les opérations culturales de la campagne sèche se déroulent normalement sur le territoire. La majorité des spéculations sont en croissance. On note aussi des récoltes de spéculations comme l'oignon, la tomate, le chou dans plusieurs localités du pays.

Risques phytosanitaires

Les conditions météorologiques passées et celles à venir, combinées à l'humidité locale résultant de l'irrigation sont favorables au développement et à la propagation de certains ennemis de la tomate, de l'oignon, du chou comme les pucerons, les mouches blanches et les acariens, la chenille légionnaire ou les maladies fongiques.

Evaluation des besoins en eau en nombre d'arrosiers selon le JAS* de quelques cultures de campagne sèche.

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADAIRE	Page : 4/5

Tableau 1 : Besoin en eau du maïs

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Maïs
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130
Balé-Sanguie-Sissili-Ioba-Iuy	3	3	4	6	9	11	14	14	14	13	11	8	6
Comoé-Léraba-KénéDougou	3	3	3	5	7	10	12	12	12	11	9	7	5
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	4	4	5	8	11	15	17	17	17	17	14	10	8
Houet	3	3	3	6	8	10	12	12	12	12	10	7	6
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	4	4	4	7	10	13	16	16	16	15	13	9	7
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélogo	4	4	4	8	11	14	17	17	17	16	14	10	8
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	4	4	5	8	11	15	18	18	18	17	14	11	8
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	4	4	4	7	10	12	15	15	15	14	12	9	7
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	4	4	4	7	9	12	15	15	15	14	12	9	7
Poni-Bougouriba-Noumbiel	3	3	3	6	8	10	12	12	12	12	10	7	6
Séno-Oudalan-Soum	4	4	5	8	11	14	17	17	17	17	14	10	8

stamp: 2026-02-01

Tableau 2 : Besoin en eau de la tomate

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Tomate
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140
Balé-Sanguie-Sissili-Ioba-Iuy	7	7	7	8	9	11	13	13	13	13	13	13	12	10
Comoé-Léraba-KénéDougou	6	6	6	7	8	9	11	11	11	11	11	11	10	9
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	9	9	9	10	12	14	16	17	17	17	17	16	15	13
Houet	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11	9
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	15	13	12
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélogo	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	16	14	13
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	9	9	9	10	12	14	16	17	17	17	17	16	15	13
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	7	7	7	8	10	12	14	14	14	14	14	14	13	11
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	7	7	7	8	10	12	13	14	14	14	14	14	13	11
Poni-Bougouriba-Noumbiel	6	6	6	7	8	10	12	12	12	12	12	12	11	9
Séno-Oudalan-Soum	9	9	9	10	12	14	16	17	17	17	17	16	15	13

stamp: 2026-02-01

Tableau 3 : Besoin en eau de l'oignon

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Oignon
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140
Balé-Sanguie-Sissili-Ioba-Iuy	7	7	7	8	9	11	13	13	13	13	13	13	12	10
Comoé-Léraba-KénéDougou	6	6	6	7	8	9	11	11	11	11	11	11	10	9
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	9	9	9	10	12	14	16	17	17	17	17	16	15	13
Houet	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11	9
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	15	13	12
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélogo	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	16	14	13
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	9	9	9	10	12	14	16	17	17	17	17	16	15	13
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	7	7	7	8	10	12	14	14	14	14	14	14	13	11
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	7	7	7	8	10	12	13	14	14	14	14	14	13	11
Poni-Bougouriba-Noumbiel	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11	9
Séno-Oudalan-Soum	9	9	9	10	12	14	16	17	17	17	17	16	15	13

stamp: 2026-02-01

Tableau 4 : Besoin en eau du chou

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Choux
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120
Balé-Sanguie-Sissili-Ioba-Iuy	8	8	8	9	10	11	12	12	12	12	12	11
Comoé-Léraba-KénéDougou	7	7	7	8	8	9	10	10	10	10	10	9
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	10	10	10	11	13	14	15	15	15	15	15	14
Houet	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	10
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	9	9	9	10	11	13	14	14	14	14	14	12
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélogo	10	10	10	11	12	13	15	15	15	15	15	13
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	10	10	10	11	13	14	15	15	15	15	15	14
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	9	9	9	10	11	12	13	13	13	13	13	12
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	9	9	9	10	11	12	13	13	13	13	13	12
Poni-Bougouriba-Noumbiel	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	10
Séno-Oudalan-Soum	10	10	10	11	13	14	15	15	15	15	15	14

stamp: 2026-02-01

* JAS (jour après semis) correspond au nombre de jours depuis la mise en semis de votre culture. Si par exemple vous êtes dans la province du Houet, et que votre chou est mis en place depuis 62 jours, le nombre d'arrosoirs pour 25 m² est 11 pour les dix jours à venir. Si votre superficie est au-delà, par exemple 100 m², utilisez une règle de trois en multipliant ce nombre par 4 soit 44 arrosoirs.

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADAIRE	Page : 5/5

Avis et conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- Continuer de surveiller les cultures pour détecter tout stress hydrique et thermique ;
- Installer des brise-vents naturels (haies, branchages) pour limiter l'effet desséchant du vent sur les jeunes plants et les cultures maraîchères.
- **Utiliser les informations de la page précédente sur les besoins en eau des cultures afin d'économiser la ressource et minimiser le risque de stress hydrique au cours de la décade à venir ;**
- Maintenir une humidité suffisante au niveau des racines ;
- Stocker adéquatement et protéger les produits de récoltes pour éviter les pertes ;
- Recycler les résidus de récolte pour nourrir le bétail et/ou protéger le sol (paillage) contre la chaleur et ainsi réduire l'évaporation ;
- Espacer les plants pour favoriser une bonne circulation d'air et réduire les maladies ;
- Privilégier l'arrosage tôt le matin ou en fin d'après-midi pour réduire les pertes d'eau ;
- Favoriser un séchage rapide du feuillage afin d'éviter les maladies cryptogamiques (champignons, moisissures) ;
- Surveiller les parcelles pour détecter précocement les infestations et les maladies probables

En rappel :

- Suivre régulièrement les prévisions météorologiques ainsi que les alertes agrométéorologiques pour planifier les activités de saison sèche ;
- Prendre des conseils auprès des agents des services techniques de l'Agriculture pour mener à bien la campagne sèche en toute sérénité.



<https://meteoburkina.bf>



<https://facebook.com/meteoburkina>

