



Médias-Agriculteurs

N° 03, période du 21 au 31 janvier 2026

Perspectives Agrométéorologiques

Prévision climatologique de l'EvapoTranspiration Potentielle

La demande climatique va présenter une baisse modérée à importante sur la majeure partie du pays par rapport à cette décade . (Figure 1).




Figure 1: prévision de l'ETP à la décade à venir
Source: GFS

Conditions météorologiques du 03 au 09 février 2026

• Vents : d'harmattan faibles à modérés sur l'ensemble du pays, avec par moments, des vents relativement forts

• ciel essentiellement nuageux à couvert avec par moments des éclaircis

• visibilité et qualité de l'air resteront bonnes dans l'ensemble, mais pourraient être réduites par la poussière en suspension dans les régions de la Tapoa, du Goulmou, du Liptako et du Yaadga ainsi que dans les grandes villes aux heures de pointes

• **Fraicheur nocturne et matinale légèrement ressentie**

• Températures : Minimales : 22°C à 25°C ; Maximales : 36°C à 40°C.

Risques phytosanitaires

Les conditions météorologiques passées et celles à venir, combinées à l'humidité locale résultant de l'irrigation sont favorables au développement et à la propagation de certains ennemis de la tomate, de l'oignon, du chou, maïs comme les pucerons, les mouches blanches et les acariens, la chenille légionnaire ou les maladies fongiques.

Evaluation des besoins en eau en nombre d'arrosoirs selon le JAS* de quelques cultures de campagne sèche.

* JAS (jour après semis) correspond au nombre de jours depuis la mise en semis de votre culture. Si par exemple vous êtes dans la province du Houet, et que votre chou est mis en place depuis 62 jours, le nombre d'arrosoirs pour 25 m² est 11 pour les dix jours à venir. Si votre superficie est au-delà, par exemple 100 m², utilisez une règle de trois en multipliant ce nombre par 4 soit 44 arrosoirs.

Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120
Balé-Sanguié-Sissili-Joba-Tuy	8	8	8	9	10	11	12	12	12	12	12	11
Comoé-Léraba-Kénédougou	7	7	7	8	8	9	10	10	10	10	10	9
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	10	10	10	11	13	14	15	15	15	15	15	14
Houet	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	10
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	9	9	9	10	11	13	14	14	14	14	14	12
Komondjari-Gourma-Tapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélégou	10	10	10	11	12	13	15	15	15	15	15	13
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	10	10	10	11	13	14	15	15	15	15	15	14
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	9	9	9	10	11	12	13	13	13	13	13	12
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	9	9	9	10	11	12	13	13	13	13	13	12
Poni-Bougouriba-Noumbiel	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	10
Séno-Oudalan-Soum	10	10	10	11	13	14	15	15	15	15	15	14

Besoins en eau (arrosage/jour pour 25 m²) — Tomate
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Iuy	7	7	7	8	9	11	13	13	13	13	13	13	12
Comoé-Léraba-Kénédougou	6	6	6	7	8	9	11	11	11	11	11	11	10
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	9	9	9	10	12	14	16	17	17	17	17	16	15
Houet	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11
Jiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	15	13
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélégou	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	16	14
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	9	9	9	10	12	14	16	17	17	17	17	16	15
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayaia	7	7	7	8	10	12	14	14	14	14	14	14	13
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	7	7	7	8	10	12	13	14	14	14	14	14	13
Poni-Bougouriba-Noumbiel	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11
Séno-Oudalan-Soum	9	9	9	10	12	14	16	17	17	17	17	16	15

stamp: 2026-02-01

Besoins en eau (arrosage/jour pour 25 m²) — Oignon
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Iuy	7	7	7	8	9	11	13	13	13	13	13	13	12	10
Comoé-Léraba-Kénédougou	6	6	6	7	8	9	11	11	11	11	11	11	10	9
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	9	9	9	10	12	14	16	17	17	17	17	16	15	13
Houet	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11	9
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	15	13	12
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélégou	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	16	14	13
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	9	9	9	10	12	14	16	17	17	17	17	16	15	13
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayaia	7	7	7	8	10	12	14	14	14	14	14	14	13	11
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	7	7	7	8	10	12	13	14	14	14	14	14	13	11
Poni-Bougouriba-Noumbiel	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11	9
Séno-Oudalan-Soum	9	9	9	10	12	14	16	17	17	17	17	16	15	13

stamp: 2026-02-01

Avis et Conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- Continuer de surveiller les cultures pour détecter tout stress hydrique et thermique ;
- Installer des brise-vents naturels (haies, branchages) pour limiter l'effet desséchant du vent sur les jeunes plants et les cultures maraîchères.
- **Utiliser les informations de la page précédente sur les besoins en eau des cultures afin d'économiser la ressource et minimiser le risque de stress hydrique au cours de la décade à venir ;**
- Maintenir une humidité suffisante au niveau des racines ;
- Stocker adéquatement et protéger les produits de récoltes pour éviter les pertes ;
- Recycler les résidus de récolte pour nourrir le bétail et/ou protéger le sol (paillage) contre la chaleur et ainsi réduire l'évaporation ;
- Espacer les plants pour favoriser une bonne circulation d'air et réduire les maladies ;
- Privilégier l'arrosage tôt le matin ou en fin d'après-midi pour réduire les pertes d'eau ;
- Favoriser un séchage rapide du feuillage afin d'éviter les maladies cryptogamiques (champignons, moisissures) ;
- Surveiller les parcelles pour détecter précocement les infestations et les maladies probables
- **En rappel :**
- Suivre régulièrement les prévisions météorologiques ainsi que les alertes agrométéorologiques pour planifier les activités de saison sèche ;
- Prendre des conseils auprès des agents des services techniques de l'Agriculture pour mener à bien la campagne sèche en toute sérénité.



<https://meteoburkina.bf>



<https://facebook.com/meteoburkina>

METEO-Burkina (ANAM)
(Ouvre ton navigateur)

