

N° 04 période du 01 au 10 février 2026

Dans ce numéro :	
Conditions climatiques de la décade	1
Perspectives agrométéorologiques	2
Besoins en eau de quelques cultures	4
Avis et conseils agrométéorologiques	5

Sommaire :

- Globalement, hausse importante des températures extrêmes
- Hausse modérée à importante des Humidités relatives, dans l'ensemble
- Globalement, baisse modérée des évaporations par rapport à la décade précédente
- Hausse importante de la demande climatique prévue, incursions de vents de mousson au Sud et Sud-ouest, ciel partiellement nuageux par moments
- **Fraicheur nocturne et matinale restera moins ressentie**

Conditions climatiques de la décade

Températures :

- Maximales : entre 35.3 °C à Bobo-Dioulasso (Houet) et 39.8 °C à Arbollé (Passoré). Globalement en hausse importante par rapport à la décade précédente sauf dans certaines localités des régions de la Tapoa, du Bankui et du Nando (Figure 1).




Figure 1 : Anomalie des températures maximales de la décade par rapport à la décade précédente

- Minimales : entre 14.7 °C à Bakata

(Ziro) et 23.4 °C à Boudry (Ganzourgou). En hausse importante par rapport à la décade précédente sur l'ensemble du pays (Figure 2).




Figure 2 : Anomalie des températures minimales de la décade par rapport à la décade précédente

Humidités relatives :

- Maximales : entre 17 % à Kindi (Boulkiemdé) et 87 % à Bama (Houet). Globalement en hausse importante par rapport à la décade précédente (Figure 3)




Figure 3 : Anomalie des humidités maximales de la décade par rapport à la décade précédente




Figure 5 : Anomalie de l'évapotranspiration de la décade par rapport à la décade précédente

• Minimales : entre 4 % à Ziga-Ziniaré (Bassitenga) et 18 % à Mangodara (Comoé). En variation légère à hausse modérée par rapport à la décade précédente sur la majeure partie du pays (Figure 4).

Suivi de la végétation : La croissance végétative est globalement similaire à une légère hausse par rapport à la moyenne 2003-2022 sur la majeure partie du territoire (Figure 6).




Figure 4 : Anomalie des humidités minimales de la décade par rapport à la décade précédente




Figure 6 : Anomalie NDVI de la décade par rapport à la normale 2003-2022

Evapotranspiration potentielle : entre 54 mm à Bérégadougou (Comoé) et 82 mm à Bogandé (Gnagna). En variation légère à baisse modérée par rapport à la décade précédente sur l'ensemble du pays (Figure 5).

Perspectives agrométéorologiques

Prévision de l'Evapotranspiration Potentielle

La demande climatique va présenter une hausse importante sur l'ensemble

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADAIRE	Page : 3/5

du pays par rapport à cette décade. (Figure 7).




Figure 7 : Anomalie prévision de l'évapotranspiration de la décade par rapport à la décade précédente

Conditions météorologiques du 13 au 19 février 2026

- Vents : prédominance vents d'harmattan faibles à modérés sur l'ensemble du pays.

Autour du 13 au 16, incursions de flux de mousson sur la partie **sud-ouest et Sud** du territoire.

En fin de période, renforcement des vents d'harmattan avec des vents soufflant par moments en rafales

- Ciel : partiellement nuageux à nuageux par moments surtout en début de période.

- Visibilité & Qualité de l'air : globalement bonnes. Sauf en fin de période où elles pourraient connaître des réductions dues à la poussière en suspension

- Températures : Minimales : 19°C à 24°C ; Maximales : 36°C à 41°C.

La fraîcheur nocturne et matinale sera moins ressentie

Risques phytosanitaires

Les conditions météorologiques passées et celles à venir (hausse des températures), combinées à la hausse prévue de la demande climatique pourraient induire **un stress hydrique ou thermique** sur les cultures. Cela pourrait créer un **risque élevé ou moyen** pour le développement et la propagation de certains ennemis de la tomate, l'oignon, le chou, le blé, la pomme de terre, la carotte comme les pucerons, les mouches blanches, les thrips, les chenilles.

Evaluation des besoins en eau en nombre d'arrosiers selon le JAS* de quelques cultures de campagne sèche.

Tableau 1 : Besoin en eau du maïs

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Maïs
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Iuy	4	4	5	8	11	14	17	17	17	17	14	10	8
Comoe-Leraba-Kenedougou	4	4	4	7	10	13	15	15	15	15	13	9	7
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	5	5	5	9	13	16	20	20	20	19	16	12	9
Houet	4	4	4	7	10	13	15	15	15	15	13	9	7
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourweogo-Bazega-Ganzourgou	5	5	5	8	12	15	19	19	19	19	18	15	11
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpelogo	5	5	5	9	12	16	19	19	19	19	16	12	9
Loroum-Passore-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	5	5	6	9	13	17	21	21	21	20	17	13	10
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	5	5	5	8	12	15	18	18	18	18	15	11	8
Nahouri-Boulgou-Zounweogo-Ziro	4	4	4	8	11	14	17	17	17	16	14	10	8
Poni-Bougouriba-Noumbiel	4	4	4	7	9	12	14	14	14	14	12	9	7
Seno-Oudalan-Soum	5	5	5	9	13	17	20	20	20	19	16	12	9

stamp: 2026-02-11

Tableau 2 : Besoin en eau de la tomate

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Tomate
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Iuy	9	9	9	10	11	14	16	16	16	16	16	16	15	13
Comoe-Leraba-Kenedougou	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	14	13	12
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	10	10	10	11	13	15	18	19	19	19	19	18	17	15
Houet	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	14	13	11
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourweogo-Bazega-Ganzourgou	9	9	9	11	12	15	17	18	18	18	18	17	16	14
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpelogo	10	10	10	11	13	15	18	18	18	18	18	18	17	14
Loroum-Passore-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	10	10	10	12	14	17	19	20	20	20	20	19	18	16
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	9	9	9	10	12	14	17	17	17	17	17	17	16	14
Nahouri-Boulgou-Zounweogo-Ziro	8	8	8	10	11	13	15	16	16	16	16	16	14	13
Poni-Bougouriba-Noumbiel	7	7	7	8	10	11	13	14	14	14	14	14	12	11
Seno-Oudalan-Soum	10	10	10	11	13	16	18	19	19	19	19	18	17	15

stamp: 2026-02-11

Tableau 3 : Besoin en eau de l'oignon

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Oignon
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Iuy	9	9	9	10	11	14	16	16	16	16	16	16	15	13
Comoe-Leraba-Kenedougou	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	14	13	12
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	10	10	10	11	13	15	18	19	19	19	19	18	17	15
Houet	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	14	13	11
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourweogo-Bazega-Ganzourgou	9	9	9	11	12	15	17	18	18	18	18	17	16	14
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpelogo	10	10	10	11	13	15	18	18	18	18	18	18	17	14
Loroum-Passore-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	10	10	10	12	14	17	19	20	20	20	20	19	18	16
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	9	9	9	10	12	14	17	17	17	17	17	17	16	14
Nahouri-Boulgou-Zounweogo-Ziro	8	8	8	10	11	13	15	16	16	16	16	16	14	13
Poni-Bougouriba-Noumbiel	7	7	7	8	10	11	13	14	14	14	14	14	12	11
Seno-Oudalan-Soum	10	10	10	11	13	16	18	19	19	19	19	18	17	15

stamp: 2026-02-11

Tableau 4 : Besoin en eau du chou

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Choux
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Iuy	10	10	10	11	12	14	15	15	15	15	15	14
Comoe-Leraba-Kenedougou	9	9	9	10	11	12	13	13	13	13	13	12
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	11	11	11	13	14	16	17	17	17	17	17	15
Houet	9	9	9	10	11	12	13	13	13	13	13	12
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourweogo-Bazega-Ganzourgou	11	11	11	12	13	15	16	16	16	16	16	15
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpelogo	11	11	11	12	14	15	17	17	17	17	17	15
Loroum-Passore-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	12	12	12	14	15	17	18	18	18	18	18	17
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	11	11	11	12	13	14	16	16	16	16	16	14
Nahouri-Boulgou-Zounweogo-Ziro	10	10	10	11	12	13	15	15	15	15	15	13
Poni-Bougouriba-Noumbiel	8	8	8	9	11	12	13	13	13	13	13	11
Seno-Oudalan-Soum	12	12	12	13	14	16	17	17	17	17	17	16

stamp: 2026-02-11

* JAS (jour après semis) correspond au nombre de jours depuis la mise en semis de votre culture. Si par exemple vous êtes dans la province du Houet, et que votre chou est mis en place depuis 62 jours, le nombre d’arrosoirs pour 25 m² est 13 pour les dix jours à venir. Si votre superficie est au-delà, par exemple 100 m², utilisé une règle de trois en multipliant ce nombre par 4 soit 52 arrosoirs.

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADAIRE	Page : 5/5

Avis et conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- Continuer de surveiller les cultures pour détecter tout stress hydrique et thermique ;
- Surveiller les parcelles de cultures afin de détecter précocement les infestations, les probables attaques de ravageurs et réduire les risques ;
- Installer des brise-vents naturels (haies, branchages) pour limiter l'effet desséchant des vents sur les plants et les cultures maraîchères.
- **Utiliser les informations de la page précédente sur les besoins en eau des cultures afin de minimiser le risque de stress hydrique et répondre aux besoins des cultures au cours de la décade à venir ;**
- Maintenir une humidité suffisante au niveau des racines ;
- Nettoyez les panneaux solaires **avant et après** la poussière pour maintenir la performance des systèmes de pompage pour une irrigation plus efficace ;
- Pour le goutte-à-goutte, inspectez et nettoyez les goutteurs et filtres pour éviter les bouchons et penser à nettoyer les feuilles des plants ;
- Stocker adéquatement et protéger les produits de récoltes pour éviter les pertes ;
- Garder les plants bien espacés pour favoriser une bonne circulation d'air et réduire les maladies ;
- Privilégier l'arrosage tôt le matin ou en fin d'après-midi pour réduire les pertes d'eau ;
- Favoriser un séchage rapide du feuillage afin d'éviter les maladies cryptogamiques (champignons, moisissures) ;

En rappel :

- Suivre régulièrement les prévisions météorologiques pour planifier les activités de saison sèche ;
- Prendre des conseils auprès des agents des services techniques de l'Agriculture pour mener à bien la campagne sèche en toute sérénité.

METEO-Burkina (ANAM)
Chaine WhatsApp



<https://meteoburkina.bf>



<https://facebook.com/meteoburkina>

