



N° 05 période du 11 au 20 février 2026

Dans ce numéro :		Sommaire : • Hausse modérée des températures minimales • Baisse modérée à importante des Humidités relatives • Hausse modérée des évaporations par rapport à la décade précédente • Baisse importante de la demande climatique prévue, orages ou pluies prévus au Sud-ouest et Sud en fin de période
Conditions climatiques de la décade	1	
Perspectives agrométéorologiques	2	
Besoins en eau de quelques cultures	4	
Avis et conseils agrométéorologiques	5	

Conditions climatiques de la décade

Températures :

• Maximales : entre 35.8 °C à Mogtédou (Ganzourgou) et 40.1 °C à Cassou (Ziro). En baisse importante par rapport à la décade précédente sur pays, sauf dans certaines localités des régions du Liptako, Tannounyan, Guiriko, Goulmou, Tapoa, où elles ont été en hausse (Figure 1).




Figure 1 : Anomalie des températures maximales de la décade par rapport à la décade précédente

• Minimales : entre 15 °C à Nobéré (Zoundwéogo) et 23.7 °C à Legmoin (Noumbiel). En variation légère à hausse modérée par rapport à la décade précédente sur l'ensemble du pays (Figure 2).




Figure 2 : Anomalie des températures minimales de la décade par rapport à la décade précédente

Humidités relatives :

• Maximales : entre 15 % à Kindi (Boulkiemdé) et 79 % à Bama (Houet). En baisse modérée à importante par

rapport à la décade précédente sur la majeure partie du pays (Figure 3).




Figure 3 : Anomalie des humidités maximales de la décade par rapport à la décade précédente

- Minimales : entre 3 % à Kindi (Boulkiemdé) et 17 % à Ziou (Nahouri). En variation légère à baisse modérée par rapport à la décade précédente sur la majeure partie du pays (Figure 4).




Figure 4 : Anomalie des humidités minimales de la décade par rapport à la décade précédente

Evapotranspiration potentielle : entre 54 mm à Bérégadougou (Comoé) et 80 mm à Bogandé (Gnagna). En variation légère à hausse modérée par rapport à la décade précédente sur la majeure partie du pays (Figure 5).




Figure 5 : Anomalie de l'évapotranspiration de la décade par rapport à la décade précédente

Suivi de la végétation La croissance végétative est globalement similaire à une légère hausse par rapport à la moyenne 2003-2022 sur la majeure partie du territoire (Figure 6).




Figure 6 : Anomalie NDVI de la décade par rapport à la normale 2003-2022

Perspectives agrométéorologiques

Prévision de l'Evapotranspiration Potentielle

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADAIRE	Page : 3/5

La demande climatique va présenter une baisse importante sur le pays par rapport à cette décade (Figure 7).




Figure 7 : Anomalie prévision de l'évapotranspiration de la décade par rapport à la décade précédente

Conditions météorologiques du 23 au 28 février 2026

- Vents : prédominance des vents d'harmattan sur la majeure partie du territoire.

Ciel : Partiellement nuageux en général.

En fin de période : **incursions de flux de mousson sur la partie sud-ouest et Sud, pouvant occasionner des**

- **Orages ou pluies isolés sur certaines localités des régions des Tannounyan, du Djôrô et du Guiriko**

- Visibilité & Qualité de l'air : Globalement bonnes.

Toutefois en début de période, elles pourraient connaître des réductions dues à la poussière en suspension, notamment dans certaines grandes villes ainsi qu'à l'Est du territoire.

- Températures : Minimales : 20°C à 25°C ; Maximales : 35°C à 40°C. **Fraicheur nocturne et matinale moins ressentie.**

Risques phytosanitaires

Les conditions météorologiques passées et celles à venir (hausse des températures), pourraient induire **un stress hydrique ou thermique** sur les cultures si l'irrigation est insuffisante. Cela pourrait aussi entraîner le développement et la propagation de certains ennemis de la tomate, l'oignon, le chou, le blé, la pomme de terre, la carotte comme les pucerons, les mouches blanches, les thrips, les chenilles.

Evaluation des besoins en eau en nombre d'arrosoirs selon le JAS* de quelques cultures de campagne sèche.

Tableau 1 : Besoin en eau du maïs

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Mais
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Tuy	3	3	4	6	9	12	14	14	14	14	11	8	6
Comoe-Leraba-Kenedougou	3	3	3	6	8	10	12	12	12	12	10	7	6
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	4	4	4	7	10	14	16	16	16	16	13	10	7
Houet	3	3	3	6	8	11	13	13	13	12	10	8	6
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourweogo-Bazega-Ganzourgou	4	4	4	7	10	13	15	15	15	15	13	9	7
Komondjari-Gourma-Ipaoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpelo	4	4	4	7	10	14	16	16	16	16	13	10	7
Loroum-Passore-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	4	4	4	8	11	14	17	17	17	16	14	10	8
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	4	4	4	7	9	12	15	15	15	14	12	9	7
Nahouri-Boulgou-Zounweogo-Ziro	4	4	4	7	10	13	15	15	15	15	12	9	7
Poni-Bougouriba-Noumbiel	3	3	3	6	8	11	13	13	13	12	10	8	6
Seno-Oudalan-Soum	4	4	4	7	11	14	16	16	16	16	13	10	8

stamp: 2026-02-21

Tableau 2 : Besoin en eau de la tomate

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Tomate
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Tuy	7	7	7	8	9	11	13	13	13	13	13	13	12	10
Comoe-Leraba-Kenedougou	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11	9
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14	12
Houet	6	6	6	7	8	10	12	12	12	12	12	12	11	9
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourweogo-Bazega-Ganzourgou	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	14	13	12
Komondjari-Gourma-Ipaoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpelo	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14	12
Loroum-Passore-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	16	14	13
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	7	7	7	8	10	12	13	14	14	14	14	14	13	11
Nahouri-Boulgou-Zounweogo-Ziro	8	8	8	9	10	12	14	14	14	14	14	14	13	11
Poni-Bougouriba-Noumbiel	6	6	6	7	9	10	12	12	12	12	12	12	11	10
Seno-Oudalan-Soum	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14	12

stamp: 2026-02-21

Tableau 3 : Besoin en eau de l'oignon

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Oignon
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Tuy	7	7	7	8	9	11	13	13	13	13	13	13	12	10
Comoe-Leraba-Kenedougou	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11	9
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14	12
Houet	6	6	6	7	8	10	12	12	12	12	12	12	11	9
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourweogo-Bazega-Ganzourgou	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	14	13	12
Komondjari-Gourma-Ipaoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpelo	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14	12
Loroum-Passore-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	16	14	13
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	7	7	7	8	10	12	13	14	14	14	14	14	13	11
Nahouri-Boulgou-Zounweogo-Ziro	8	8	8	9	10	12	14	14	14	14	14	14	13	11
Poni-Bougouriba-Noumbiel	6	6	6	7	9	10	12	12	12	12	12	12	11	10
Seno-Oudalan-Soum	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14	12

stamp: 2026-02-21

Tableau 4 : Besoin en eau du chou

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Choux
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Tuy	8	8	8	9	10	11	12	12	12	12	12	11
Comoe-Leraba-Kenedougou	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	10
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	9	9	9	11	12	13	14	14	14	14	14	13
Houet	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	10
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourweogo-Bazega-Ganzourgou	9	9	9	10	11	12	14	14	14	14	14	12
Komondjari-Gourma-Ipaoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpelo	9	9	9	11	12	13	14	14	14	14	14	13
Loroum-Passore-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	10	10	10	11	12	13	15	15	15	15	15	13
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	9	9	9	10	11	12	13	13	13	13	13	12
Nahouri-Boulgou-Zounweogo-Ziro	9	9	9	10	11	12	13	13	13	13	13	12
Poni-Bougouriba-Noumbiel	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	10
Seno-Oudalan-Soum	10	10	10	11	12	13	14	14	14	14	14	13

stamp: 2026-02-21

* JAS (jour après semis) correspond au nombre de jours depuis la mise en semis de votre culture. Si par exemple vous êtes dans la province du Houet, et que votre chou est mis en place depuis 62 jours, le nombre d’arrosoirs pour 25 m² est 11 pour les dix jours à venir. Si votre superficie est au-delà, par exemple 100 m², utilisé une règle de trois en multipliant ce nombre par 4 soit 44 arrosoirs.

Avis et conseils agrométéorologiques

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADAIRE	Page : 5/5

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- Protéger les produits de récolte contre la pluie et poussière prévue ;
- Surveiller régulièrement les parcelles de cultures contre les probables attaques de ravageurs (thrips, pucerons, acariens, chenilles) et réduire les risques ;
- Installer des brise-vents naturels (haies, branchages) pour limiter l'effet desséchant des vents sur les plants et les cultures maraîchères.
- **Utiliser les informations de la page précédente sur les besoins en eau des cultures afin d'ajuster l'irrigation à la baisse et éviter le gaspillage) au cours de la décade à venir ;**
- Maintenir une humidité suffisante au niveau des racines ;
- Nettoyez les panneaux solaires **avant et après** la poussière pour maintenir la performance des systèmes de pompage pour une irrigation plus efficace ;
- Pour le goutte-à-goutte, inspectez et nettoyez les goutteurs et filtres pour éviter les bouchons et penser à nettoyer les feuilles des plants ;
- Stocker adéquatement et protéger les produits de récoltes pour éviter les pertes ;
- Garder les plants bien espacés pour favoriser une bonne circulation d'air et réduire les maladies ;
- Privilégier l'arrosage tôt le matin ou en fin d'après-midi pour réduire les pertes d'eau ;
- Eviter l'humidité excessive du feuillage afin de réduire les risques de maladies cryptogamiques (champignons, moisissures) ;

En rappel :

- Suivre régulièrement les prévisions météorologiques pour planifier les activités de saison sèche ;
- Prendre des conseils auprès des agents des services techniques de l'Agriculture pour mener à bien la campagne sèche en toute sérénité.



<https://meteoburkina.bf>



METEO-Burkina (ANAM)
Chaîne WhatsApp



<https://facebook.com/meteoburkina>

