



Médias-Agriculteurs
N° 06, période du 21 au 28 février 2026

Perspectives Agrométéorologiques

Prévision climatologique de l'EvapoTranspiration Potentielle

La demande climatique va présenter une variation légère à hausse importante sur la majeure partie du pays par rapport à cette décade. Exceptés les localités des régions du Nando, Djôro, Tannounyan et du Guiriko où la baisse sera modérée (Figure 1).




Figure 1: prévision de l'ETP à la décade à venir
Source: GFS

Conditions météorologiques du 03 au 09 mars 2026

- Vents : prédominance des vents d'harmattan sur la majeure partie du territoire.
- Incursions de flux de mousson sur la partie Sud-ouest et Sud du pays
- ciel très nuageux à couvert par moments
- Orages ou pluies isolés par moments sur certaines localités des régions des Tannounyan, du Djôro et du Guiriko ainsi qu'au Sud du Nando et de Bankui
- Visibilité & Qualité de l'air : resteront en général affectées par la poussière en suspension dans les parties Est et Nord du pays ainsi que dans les grandes villes, avec toutefois des améliorations par moments.
- Températures : Minimales : 23°C à 28°C ; Maximales : 36°C à 40°C.

Risques phytosanitaires

Conditions climatiques observées et prévues peuvent induire un stress hydrique ou thermique sur les cultures. Risque de développement et de propagation de certains ennemis de la tomate, l'oignon, le chou, le blé, la pomme de terre, la carotte comme les pucerons, les mouches blanches, les thrips, les chenilles.

Evaluation des besoins en eau en nombre d'arrosoirs selon le JAS* de quelques cultures de campagne sèche.

* JAS (jour après semis) correspond au nombre de jours depuis la mise en semis de votre culture. Si par exemple vous êtes dans la province du Houet, et que votre chou est mis en place depuis 62 jours, le nombre d'arrosoirs pour 25 m² est 11 pour les dix jours à venir. Si votre superficie est au-delà, par exemple 100 m², utilisez une règle de trois en multipliant ce nombre par 4 soit 44 arrosoirs.

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Choux
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120
Bale-Sanguié-Sissili-Ioba-Tuy	8	8	8	9	10	11	12	12	12	12	12	10
Comoé-Léraba-Kénédougou	6	6	6	7	8	9	10	10	10	10	10	9
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	12	12	12	14	15	17	18	18	18	18	18	17
Houet	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	10
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	9	9	9	11	12	13	14	14	14	14	14	13
Komondjari-Gourma-Ipoba-Kompenga-Kouritenga-Koulpélégou	11	11	11	13	14	16	17	17	17	17	17	15
Loroum-Passoré-Yatenga-Zoundma-Sourou-Bam	11	11	11	12	14	15	17	17	17	17	17	15
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	9	9	9	10	11	13	14	14	14	14	14	12
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	9	9	9	10	11	13	14	14	14	14	14	12
Poni-Bougouriba-Noumbiel	7	7	7	8	9	10	10	10	10	10	10	9
Seno-Oudalan-Soum	12	12	12	14	16	17	19	19	19	19	19	17

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Tomate
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Iuy	7	7	7	8	9	10	12	13	13	13	13	12	11
Comoé-Léraba-Kénédougou	6	6	6	6	7	9	10	11	11	11	11	10	9
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	11	11	11	12	14	17	19	20	20	20	20	20	18
Houet	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11
Jiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14
Komondjari-Gourma-Tapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélégou	10	10	10	11	13	15	18	19	19	19	19	18	17
Loroum-Passoré-Yatenga-Zoundama-Sourou-Bam	9	9	9	11	13	15	17	18	18	18	18	18	16
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayaia	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	15	13
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	15	14
Poni-Bougouriba-Noumbiel	6	6	6	7	8	9	11	11	11	11	11	11	10
Séno-Oudalan-Soum	11	11	11	12	14	17	20	21	21	21	21	20	18

stamp: 2026-03-01

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Oignon
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Iuy	7	7	7	8	9	10	12	13	13	13	13	12	11	10
Comoé-Léraba-Kénédougou	6	6	6	6	7	9	10	11	11	11	11	10	9	8
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	11	11	11	12	14	17	19	20	20	20	20	20	18	16
Houet	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11	9
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14	12
Komondjari-Gourma-Tapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélégou	10	10	10	11	13	15	18	19	19	19	19	18	17	15
Loroum-Passoré-Yatenga-Zoundama-Sourou-Bam	9	9	9	11	13	15	17	18	18	18	18	18	16	14
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayaia	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	15	13	12
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	15	14	12
Poni-Bougouriba-Noumbiel	6	6	6	7	8	9	11	11	11	11	11	11	10	9
Séno-Oudalan-Soum	11	11	11	12	14	17	20	21	21	21	21	20	18	16

stamp: 2026-03-01

Avis et Conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- Protéger les produits de récolte contre la pluie et la poussière prévue ;
- Vigilance dans les localités Sud-Ouest et Sud (incursions humides) où les risques de maladies fongiques s'ajoutent aux attaques de ravageurs
- Inspecter régulièrement les parcelles pour détecter précocement les foyers de pucerons, thrips et chenilles etc. ;
- Installer des brise-vents naturels (haies, branchages) pour limiter l'effet desséchant des vents sur les plants et les cultures maraîchères.
- Consulter les informations de la page précédente sur les besoins en eau des cultures afin d'ajuster l'irrigation au cours de la décade à venir ;
- Maintenir une humidité suffisante au niveau des racines ;
- Nettoyez les panneaux solaires avant et après la poussière pour maintenir la performance des systèmes de pompage pour une irrigation plus efficace ;
- Pour le goutte-à-goutte, inspectez et nettoyez les goutteurs et filtres pour éviter les bouchons ;
- Stocker adéquatement et protéger les produits de récoltes pour éviter les pertes ;
- Garder les plants bien espacés pour favoriser une bonne circulation d'air et réduire les maladies ;
- Privilégier l'arrosage tôt le matin ou en fin d'après-midi pour réduire les pertes d'eau ;
- Eviter l'humidité excessive du feuillage afin de réduire les risques de maladies cryptogamiques (champignons, moisissures) ;

En rappel :

- Suivre régulièrement les prévisions météorologiques pour planifier les activités de saison sèche ;
- Prendre des conseils auprès des agents des services techniques de l'Agriculture.



<https://meteoburkina.bf>



<https://facebook.com/meteoburkina>

