



N° 06 période du 21 au 28 février 2026

Dans ce numéro :		<i>Sommaire :</i> • variation légère à baisse modérée des températures maximales • Hausse modérée à importante des Humidités relatives maximales • Baisse importante des évaporations par rapport à la décade précédente • Variation légère à hausse importante de la demande climatique prévue, orages ou pluies prévus au Sud-ouest et Sud du pays, poussière à l'Est et Nord du territoire
Conditions climatiques de la décade	1	
Perspectives agrométéorologiques	2	
Besoins en eau de quelques cultures	4	
Avis et conseils agrométéorologiques	5	

Conditions climatique de la décade

Températures :

- Maximales : entre 36 °C à Barsalogho (Sandbondtenga) et 41.2 °C à Cassou (Ziro). En variation légère à baisse modérée sur la totalité du pays (Figure 1).




Figure 1 : Anomalie des températures maximales de la décade par rapport à la décade précédente

- Minimales : entre 14.6 °C à Bakata (Ziro) et 24.7 °C à Tenkodogo (Boulgou). En hausse importante

par rapport à la décade précédente sur la majeure partie du pays sauf dans certaines localités des régions du Guiriko, Tannounyan, Djôro, Yaadga, Kuilsé, Nakambé, du Nazinon et du Nando (Figure 2).




Figure 2 : Anomalie des températures minimales de la décade par rapport à la décade précédente

Humidités relatives :

- Maximales : entre 12 % à Kindi (Boulkiemdé) et 84 % à Bama (Houet). En baisse modérée à importante par

rapport à la décade précédente sur l'ensemble du pays (Figure 3).




Figure 3 : Anomalie des humidités maximales de la décade par rapport à la décade précédente

• Minimales : entre 4 % à Ziga_Ziniaré (Bassitenga) et 20 % à Bobo-Dioulasso (Houet). En variation légère à hausse modérée par rapport à la décade précédente sur la majeure partie du pays sauf sur la partie Sud du territoire (Figure 4).




Figure 4 : Anomalie des humidités minimales de la décade par rapport à la décade précédente

Evapotranspiration potentielle : entre 42 mm à Bérégadougou (Comoé) et 68 mm à Bogandé (Gnagna). En baisse importante par rapport à la décade

précédente sur l'ensemble du pays. (Figure 5).




Figure 5 : Anomalie de l'évapotranspiration de la décade par rapport à la décade précédente

Suivi de la végétation : La croissance végétative est globalement similaire à une légère hausse par rapport à la moyenne 2003-2022 sur la majeure partie du territoire (Figure 6).




Figure 6 : Anomalie NDVI de la décade par rapport à la normale 2003-2022

Perspectives agrométéorologiques

Prévision de l'Evapotranspiration Potentielle

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADAIRE	Page : 3/5

La demande climatique va présenter une variation légère à hausse importante sur la majeure partie du pays par rapport à cette décade. Exceptés les localités des régions du Nando, Djôro, Tannounyan et du Guiriko ou la baisse sera modérée. (Figure 7).




Figure 7 : Anomalie prévision de l'évapotranspiration de la décade par rapport à la décade précédente

Conditions météorologiques du 03 au 09 mars 2026

- Vents : prédominance des vents d'harmattan sur la majeure partie du territoire.
- **Incursions de flux de mousson sur la partie Sud-ouest et Sud du pays**
- ciel très nuageux à couvert par moments
- **Orages ou pluies isolés** par moments sur certaines localités des régions **des Tannounyan, du Djôrô et**

du Guiriko ainsi qu'au Sud du Nando et de Bankui

- Visibilité & Qualité de l'air : **resteront en général affectées par la poussière en suspension dans les parties Est et Nord du pays ainsi que dans les grandes villes, avec toutefois des améliorations par moments.**

- Températures : Minimales : 23°C à 28°C ; Maximales : 36°C à 40°C.

Risques phytosanitaires

Les conditions météorologiques passées et celles à venir (hausse des températures et de la demande climatique), pourraient induire **un stress hydrique ou thermique** sur les cultures, surtout sensibles comme la tomate, le chou, la pomme de terre, le blé et l'oignon, si l'irrigation est insuffisante. Cela pourrait aussi entraîner le développement et la propagation de certains ennemis de la tomate, l'oignon, le chou, le blé, la pomme de terre, la carotte comme les pucerons, les mouches blanches, les thrips, les chenilles. **Les pluies prévues** peuvent provoquer des verses et favoriser l'apparition de maladies cryptogamiques si l'humidité persiste.

Evaluation des besoins en eau en nombre d'arrosoirs selon le JAS* de quelques cultures de campagne sèche.

Tableau 1 : Besoin en eau du maïs

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Maïs

Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Iuy	3	3	4	6	8	11	13	13	13	13	11	8	6
Comoé-Léraba-KénéDougou	3	3	3	5	7	9	11	11	11	11	9	7	5
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	5	5	6	9	14	18	21	21	21	21	17	13	10
Houet	3	3	3	6	8	10	13	13	13	12	10	8	6
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	4	4	4	7	10	14	16	16	16	16	13	10	7
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélégou	5	5	5	9	13	16	20	20	20	19	16	12	9
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	5	5	5	9	12	16	19	19	19	19	16	11	9
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	4	4	4	7	10	13	16	16	16	15	13	9	7
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	4	4	4	7	10	13	16	16	16	15	13	9	7
Poni-Bougouriba-Noumbiel	3	3	3	5	8	10	12	12	12	12	10	7	5
Séno-Oudalan-Soum	5	5	6	10	14	18	21	21	21	21	17	13	10

stamp: 2026-03-01

Tableau 2 : Besoin en eau de la tomate

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Tomate

Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Iuy	7	7	7	8	9	10	12	13	13	13	13	12	11	10
Comoé-Léraba-KénéDougou	6	6	6	6	7	9	10	11	11	11	11	10	9	8
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	11	11	11	12	14	17	19	20	20	20	20	20	18	16
Houet	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11	9
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14	12
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélégou	10	10	10	11	13	15	18	19	19	19	19	18	17	15
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	9	9	9	11	13	15	17	18	18	18	18	18	16	14
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	15	13	12
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	15	14	12
Poni-Bougouriba-Noumbiel	6	6	6	7	8	9	11	11	11	11	11	11	10	9
Séno-Oudalan-Soum	11	11	11	12	14	17	20	21	21	21	21	20	18	16

stamp: 2026-03-01

Tableau 3 : Besoin en eau de l'oignon

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Oignon

Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Iuy	7	7	7	8	9	10	12	13	13	13	13	12	11	10
Comoé-Léraba-KénéDougou	6	6	6	6	7	9	10	11	11	11	11	10	9	8
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	11	11	11	12	14	17	19	20	20	20	20	20	18	16
Houet	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11	9
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14	12
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélégou	10	10	10	11	13	15	18	19	19	19	19	18	17	15
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	9	9	9	11	13	15	17	18	18	18	18	18	16	14
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	15	13	12
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	15	14	12
Poni-Bougouriba-Noumbiel	6	6	6	7	8	9	11	11	11	11	11	11	10	9
Séno-Oudalan-Soum	11	11	11	12	14	17	20	21	21	21	21	20	18	16

stamp: 2026-03-01

Tableau 4 : Besoin en eau du chou

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Choux

Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Iuy	8	8	8	9	10	11	12	12	12	12	12	10
Comoé-Léraba-KénéDougou	6	6	6	7	8	9	10	10	10	10	10	9
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	12	12	12	14	15	17	18	18	18	18	18	17
Houet	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	10
Kadiogo-Ouhritenga-Boulkiemde-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	9	9	9	11	12	13	14	14	14	14	14	13
Komondjari-Gourma-Iapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélégou	11	11	11	13	14	16	17	17	17	17	17	15
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	11	11	11	12	14	15	17	17	17	17	17	15
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	9	9	9	10	11	13	14	14	14	14	14	12
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	9	9	9	10	11	13	14	14	14	14	14	12
Poni-Bougouriba-Noumbiel	7	7	7	8	9	9	10	10	10	10	10	9
Séno-Oudalan-Soum	12	12	12	14	16	17	19	19	19	19	19	17

stamp: 2026-03-01

* JAS (jour après semis) correspond au nombre de jours depuis la mise en semis de votre culture. Si par exemple vous êtes dans la province du Houet, et que votre chou est mis en place depuis 62 jours, le nombre d’arrosoirs pour 25 m² est 11 pour les dix jours à venir. Si votre superficie est au-delà, par exemple 100 m², utilisé une règle de trois en multipliant ce nombre par 4 soit 44 arrosoirs.

	BULLETIN	Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00
		Date : 29 octobre 2024
	AGROMETEOROLOGIQUE DECADAIRE	Page : 5/5

Avis et conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- Protéger les produits de récolte contre la pluie et la poussière prévue ;
- Vigilance dans les localités **Sud-Ouest et Sud** (incursions humides) où les risques de maladies fongiques s'ajoutent aux attaques de ravageurs
- Inspecter régulièrement les parcelles pour détecter précocement les foyers de pucerons, thrips et chenilles etc. ;
- Installer des brise-vents naturels (haies, branchages) pour limiter l'effet desséchant des vents sur les plants et les cultures maraîchères.
- **Consulter les informations de la page précédente sur les besoins en eau des cultures afin d'ajuster l'irrigation au cours de la décade à venir ;**
- Maintenir une humidité suffisante au niveau des racines ;
- Nettoyez les panneaux solaires **avant et après** la poussière pour maintenir la performance des systèmes de pompage pour une irrigation plus efficace ;
- Pour le goutte-à-goutte, inspectez et nettoyez les goutteurs et filtres pour éviter les bouchons ;
- Stocker adéquatement et protéger les produits de récoltes pour éviter les pertes ;
- Garder les plants bien espacés pour favoriser une bonne circulation d'air et réduire les maladies ;
- Privilégier l'arrosage tôt le matin ou en fin d'après-midi pour réduire les pertes d'eau ;
- Eviter l'humidité excessive du feuillage afin de réduire les risques de maladies cryptogamiques (champignons, moisissures) ;

En rappel :

- Suivre régulièrement les prévisions météorologiques pour planifier les activités de saison sèche ;
- Prendre des conseils auprès des agents des services techniques de l'Agriculture.



<https://meteoburkina.bf>



<https://facebook.com/meteoburkina>

METEO-Burkina (ANAM)
Chaine WhatsApp

