AGENCE NATIONALE
DE LA METEOROLOGIE

BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

N° 31 Valable du 11 au 20 novembre 2025

Dans ce numéro :

Conditions climatiques de la décade	1
Perspectives agrométéorologiques	2
Besoins en eau de quelques cultures	3
Avis et conseils agrométéorologiques	4

Sommaire :

- Hausse modérée à importante des températures maximales
- Baisse importante des Humidités relatives
- Baisse importante des évaporations par rapport à la décade précédente
- Baisse modérée ou variation légère de la demande climatique prévue
- **La fraicheur se fera de plus en plus ressentir,**

Conditions climatique de la décade

Températures :

• Maximales : entre 33.8 °C à Sidéradougou (Comoé) et 41.7 °C à Ourgou-Manega (Bassitenga). En hausse modérée à importante par rapport à la décade précédente sur la majeure partie du pays (Figure 1).




Figure 1 : Anomalie des températures maximales de la décade par rapport à la décade précédente

• Minimales : entre 19.9 °C à Orodara (Kénédougou) et 25.9 °C à Boussé (Kourwéogo). En variation légère à hausse modérée par rapport à la décade précédente sur le pays, sauf dans les régions du Guiriko, des Tannounyan et de Bankui où une baisse modérée a été enregistrée (Figure 2).




Figure 2 : Anomalie des températures minimales de la décade par rapport à la décade précédente

Humidités relatives :

• Maximales : entre 42 % à Titao (Loroum) et 100 % à Loumana (Léraba). En baisse importante par rapport à la décade précédente sur le pays sauf dans les régions du Djôrô et

des Tannounyan où des hausses modérées ont été notées (Figure 3)




Figure 3 : Anomalie des humidités maximales de la décade par rapport à la décade précédente

• Minimales : entre 12 % à Boussouma (Sandbondtenga) et 77 % à Sidéradougou (Comoé). En hausse importante par rapport à la décade précédente sur l'ensemble du pays (Figure 4).




Figure 4 : Anomalie des humidités minimales de la décade par rapport à la décade précédente

Evapotranspiration potentielle : entre 41 mm à Boromo (Balé) et 57 mm à Ouahigouya (Yatenga). En baisse importante par rapport à la décade précédente sur l'ensemble du pays.

Suivi de la végétation : La croissance végétative est similaire à légère hausse par rapport à la moyenne 2003-2022 sur la majeure partie du territoire (Figure 6).




Figure 5 : Anomalie NDVI de la décade par rapport à la normale 2003-2022

Perspectives agrométéorologiques

Prévision de l'Evapotranspiration Potentielle

La demande climatique va présenter une baisse modérée à variation légère sur la majeure partie du pays par rapport à cette décade (Figure 7).




Figure 6 : Anomalie prévision de l'évapotranspiration de la décade par rapport à la décade précédente

Conditions météorologiques du 13 au 19 novembre 2026

• La période du 13 au 19 novembre 2026 sera marquée par un affaiblissement des vents de mousson au profit des flux d'harmattan. Le ciel sera en général, peu nuageux à partiellement nuageux par moments.

• Les visibilités et la qualité de l'air seront par moments affectées par la poussière et la fumée en suspension principalement dans les grandes villes et surtout aux heures crépusculaires.

• **La fraicheur se fera de plus en plus ressentir,** les températures minimales moyennes seront comprises entre 20 et 26 °C

•. Les températures maximales moyennes varieront entre 32 et 39 °C sur l'ensemble du pays




Figure 7 : Températures minimales moyennes sur la période du 13 au 19 novembre 2026




Figure 8 : Températures maximales moyennes sur la période du 13 au 19 novembre 2026

Figure 7 : Température maximales et minimales prévues

Evaluation des besoins en eau en nombre d'arrosoirs selon le JAS* de quelques cultures de campagne sèche

Tableau 1 : Besoin en eau du maïs

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Maïs
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Tuy	3	3	3	6	8	11	13	13	13	13	11	8	6
Comoé-Léraba-Kénédougou	3	3	3	5	6	8	10	10	10	10	8	6	5
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	4	4	4	7	9	12	15	15	15	14	12	9	7
Houet	3	3	3	5	7	9	11	11	11	11	9	7	5
Kadiogo-Oubritenga-Boulkiemdé-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	4	4	4	6	9	12	14	14	14	14	11	8	6
Komondjari-Gourma-Tapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélogo	4	4	4	7	9	12	15	15	15	14	12	9	7
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	4	4	4	7	10	14	16	16	16	16	13	10	7
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	4	4	4	6	9	12	14	14	14	14	11	8	6
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	3	3	3	6	8	10	12	12	12	12	10	7	6
Poni-Bougouriba-Noumbiel	3	3	3	5	8	10	12	12	12	12	10	7	5
Séno-Oudalan-Soum	4	4	4	7	10	13	16	16	16	15	13	9	7

stamp: 2026-11-10

Tableau 2 : Besoin en eau de la tomate

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Tomate
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Tuy	6	6	6	7	9	10	12	12	12	12	12	12	11	10
Comoé-Léraba-Kénédougou	5	5	5	6	7	8	9	10	10	10	10	9	9	8
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	7	7	7	8	10	12	14	14	14	14	14	14	13	11
Houet	5	5	5	6	7	9	10	10	10	10	10	10	9	8
Kadiogo-Oubritenga-Boulkiemdé-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	7	7	7	8	9	11	13	13	13	13	13	13	12	11
Komondjari-Gourma-Tapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélogo	7	7	7	8	10	12	13	14	14	14	14	14	13	11
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14	12
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	7	7	7	8	9	11	13	13	13	13	13	13	12	11
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11	9
Poni-Bougouriba-Noumbiel	6	6	6	7	8	9	11	11	11	11	11	11	10	9
Séno-Oudalan-Soum	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	14	13	12

stamp: 2026-11-10

Tableau 3 : Besoin en eau de l'oignon

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Oignon
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Tuy	6	6	6	7	9	10	12	12	12	12	12	12	11	10
Comoé-Léraba-Kénédougou	5	5	5	6	7	8	9	10	10	10	10	9	9	8
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	7	7	7	8	10	12	14	14	14	14	14	14	13	11
Houet	5	5	5	6	7	9	10	10	10	10	10	10	9	8
Kadiogo-Oubritenga-Boulkiemdé-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	7	7	7	8	9	11	13	13	13	13	13	13	12	11
Komondjari-Gourma-Tapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélogo	7	7	7	8	10	12	13	14	14	14	14	14	13	11
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	8	8	8	9	11	13	15	16	16	16	16	15	14	12
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	7	7	7	8	9	11	13	13	13	13	13	13	12	11
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	6	6	6	7	8	10	11	12	12	12	12	12	11	9
Poni-Bougouriba-Noumbiel	6	6	6	7	8	9	11	11	11	11	11	11	10	9
Séno-Oudalan-Soum	8	8	8	9	10	12	14	15	15	15	15	14	13	12

stamp: 2026-11-10

Tableau 4 : Besoin en eau du chou

Besoins en eau (arrosoirs/jour pour 25 m²) — Choux
Phases de culture : jours après semis sur la première ligne

Provinces	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120
Balé-Sanguié-Sissili-Ioba-Tuy	8	8	8	8	9	10	11	11	11	11	11	10
Comoé-Léraba-Kénédougou	6	6	6	7	7	8	9	9	9	9	9	8
Gnagna-Yagha-Namentenga-Sanmentenga	9	9	9	10	11	12	13	13	13	13	13	12
Houet	6	6	6	7	8	9	10	10	10	10	10	9
Kadiogo-Oubritenga-Boulkiemdé-Kourwéogo-Bazéga-Ganzourgou	8	8	8	9	10	11	12	12	12	12	12	11
Komondjari-Gourma-Tapoa-Kompienga-Kouritenga-Koulpélogo	9	9	9	10	11	12	13	13	13	13	13	12
Loroum-Passoré-Yatenga-Zondoma-Sourou-Bam	10	10	10	11	12	13	14	14	14	14	14	13
Mouhoun-Banwa-Kossi-Nayala	8	8	8	9	10	11	12	12	12	12	12	11
Nahouri-Boulgou-Zounwéogo-Ziro	7	7	7	8	9	10	11	11	11	11	11	10
Poni-Bougouriba-Noumbiel	7	7	7	8	9	9	10	10	10	10	10	9
Séno-Oudalan-Soum	9	9	9	10	11	12	14	14	14	14	14	12

stamp: 2026-11-10

** JAS (jour après semis) correspond au nombre de jours depuis la mise en semis de votre culture. Si par exemple vous êtes dans la province du Houet, et que votre chou est mis en place depuis 62 jours, le nombre d'arrosoirs pour 25 m^2 est 10 pour les dix jours à venir. Si votre superficie est au-delà, par exemple 100 m^2, utilisé une règle de trois en multipliant ce nombre par 4 soit 40 arrosoirs.*

Avis et conseils agrométéorologiques

- Poursuivre la récolte des cultures arrivées à maturité ;
- Bien sécher les produits récoltés sur des supports propres avant leur stockage, afin d'éviter les pertes post-récolte.
- Utiliser des infrastructures adéquates pour le stockage et la protection des produits de récolte.
- Recycler les résidus de récolte pour nourrir le bétail ou protéger le sol (paillage) contre la chaleur et ainsi réduire l'évaporation ;
- Surveiller les pépinières pour détecter tout stress hydrique et thermique : arroser tôt le matin ou en fin d'après-midi ;
- **Utiliser les informations de la page précédente sur les besoins en eau des cultures pour économiser la ressource et minimiser le risque de stress hydrique**
- Surveiller les parcelles pour détecter précocement les ravageurs et maladies (rongeurs, oiseaux granivores, chenilles légionnaires, etc.).
- Espacer les plants pour favoriser une bonne circulation d'air et réduire les maladies ;

En rappel :

- Suivre régulièrement les prévisions météorologiques ainsi que les alertes agrométéorologiques pour planifier les activités de récolte et de saison sèche ;
- Prendre des conseils auprès des agents des services techniques de l'Agriculture pour mener à bien la campagne sèche en toute sérénité.

METEO-Burkina (ANAM)
Chaîne WhatsApp

https://meteoburkina.bf https://facebook.com/meteoburkina