

N° 1 période du 16/07/2026 - 23/07/2026

Sommaire

- Pluviométrie globalement déficitaire dans plusieurs localités du pays par rapport à la moyenne (1991-2020) de la décade
- Température moyenne globalement en baisse
- Humidité moyenne en hausse par rapport à la décade précédente
- **Orages et pluies attendus sur la majeure partie du pays**

Situation pluviométrique

Les hauteurs de pluie décadaires enregistrées ont varié de 0 mm à 114,5 mm en quatre (4) jours de pluie à Bobo-Dioulasso (Houet). Les cumuls les plus importants ont concerné les régions du **Nazinon, du Nakambé, du Guiriko, de Oubri, des Koulé et de la Sirba** (figure 1).

Les cumuls pluviométriques saisonniers du 01 avril au 20 juin 2026 ont fluctué entre 21.8 mm en douze jours de pluies à Zitenga (Bassitenga) à 461,4 mm en vingt-six (26) jours à Loropéni (Poni).

LEGENDE

Températures minimales observées en °C
Températures maximales observées en °C




Figure 1 : Cumul pluviométrique décadaire

Comparée à la même période de l'année passée, la pluviométrie a été globalement excédentaire sur les parties Est, Centre et Sud-ouest du territoire, le reste du pays a connu des déficits (figure 2).




Figure 2 : Anomalie du cumul pluviométrique par rapport à l'année passée

Comparés avec la moyenne décennale (1991-2020), les cumuls pluviométriques de cette décade se sont révélés globalement déficitaires sur la majeure partie du territoire avec toutefois des excédents dans les localités Est, Sud-ouest et Ouest du pays (figure 3).




Figure 3 : Anomalie du cumul pluviométrique par rapport à la moyenne 1991-2020

Situation agrométéorologique

Évolution de la température moyenne

Températures moyennes sous abri entre 27 °C à **Toussiana** (Houet) et 32,6 °C à **Dori** (Séno). Comparée à la décade précédente, une baisse modérée à importante des températures a été observée sur la majeure partie du pays (figure 4).




Figure 4 : Anomalie des températures moyennes par rapport à la décade précédente

Évolution de l'humidité relative moyenne

Les humidités relatives moyennes sous abri ont varié entre 57 % à Titao (Loroum) et 88 % à Ziou (Zoundwéogo). Comparée à la décade précédente, une hausse modérée à importante de l'humidité a été observée sur l'ensemble du pays (figure 5).




Figure 5 : Anomalie des humidités moyennes par rapport à la décade précédente

Suivi de la végétation

La croissance végétative est globalement similaire à légèrement en hausse sur la majeure partie du territoire par rapport à la moyenne 2003-2022, avec cependant de légères baisses sur des localités des régions du Nando, du Nazinon, du Nakambé, du Guiriko, du Goulmou, de la Tapoa, du Bankui et du Djôrô (figure 6).




Figure 6 : Anomalie NDVI de la décade par rapport à la décade précédente

Perspectives agrométéorologiques

Conditions météorologiques des prochains jours

Ciel en général nuageux à très nuageux, avec des orages et des pluies isolés par moments. Des manifestations orageuses et pluvieuses pourraient évoluer sur la majeure partie du territoire. Les quantités de pluie attendues pourraient atteindre ou dépasser 50 mm dans certaines localités. Températures : minimales moyennes entre 22 °C et 30 °C ; maximales moyennes entre 32 °C et 40 °C.




Figure 7 : Cumuls pluviométriques prévus (Source NOAA GFS)

Selon les résultats de la prévision saisonnière

Démarrage de la saison :
tardif dans plusieurs zones
de la moitié Sud du pays ;
proche de la normale dans
la moitié Nord du territoire.

Pluviométrie JJA (Juin-Juillet-Août) : normale à déficitaire sur la majeure partie du pays ; déficitaire à tendance normale sur le Sud de certaines régions.

Avis et Conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- Poursuivre et accélérer les labours et semis dans les régions du **Djôrô, des Tannounyan, du Guiriko, du Nazinon, du Bankui, du Nakambé, du Goulmou, de la Tapoa, des Koulsé, du Nando et de Oubri.**
- Commencer ou poursuivre les labours et semis dans les régions de la **Sirba, du Sourou, du Yaadga.**
- Profiter des conditions humides prévues pour accélérer et achever la **préparation des champs.**
- Apporter de la fumure organique dans les champs pour améliorer la fertilité du sol.
- Surveiller les cultures qui seraient déjà en phase de levée dans plusieurs localités du pays, afin de détecter précocement les risques d'attaque sur les premiers semis.
- Utiliser des semences bien adaptées au regard des prévisions saisonnières
- Utiliser les techniques de conservation de l'eau et de l'humidité pour faire face aux déficits pluviométriques prévus.

- Protéger tout bien sensible à l'humidité des **pluies prévues**.
- Pendant les orages : ne pas s'abriter sous les arbres, ni s'approcher des pylônes électriques (risque de foudre).
- Suivre les prévisions météorologiques quotidiennes ainsi que les alertes météorologiques pour planifier les activités.
- Prendre conseils également avec les services techniques de l'agriculture et veiller à l'utilisa-tion des semences saines où à les traiter.

MÉTÉO-Burkina (ANAM)

Chaîne WhatsApp

<https://meteoburkina.bf>

<https://facebook.com/meteoburkina>