

— BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE DÉCADAIRE

N°2 — Du 19 au 19 juillet 2026

Situation pluviométrique et agrométéorologique de la décade, perspectives pour la décade à venir et conseils aux producteurs.

Valable du 19 au 19 juillet 2026

Publié le 18/07/2026

Réf : ANAM/PAM/PR_10/BN_01/V00

Ce qu'il faut retenir

- Pluviométrie globalement déficitaire dans plusieurs localités du pays par rapport à la moyenne (1991-2020) de la décade
- Température moyenne globalement en baisse
- Humidité moyenne en hausse par rapport à la décade précédente
- **Orages et pluies attendus sur la majeure partie du pays**

01 Situation pluviométrique

Les hauteurs de pluie décadaires enregistrées ont varié de 0 mm à 114,5 mm en quatre (4) jours de pluie à Bobo-Dioulasso (Houet). Les cumuls les plus importants ont concerné les régions du **Nazinon, du Nakambé, du Guiriko, de Oubri, des Koulsé et de la Sirba** (figure 1).

Les cumuls pluviométriques saisonniers du 01 avril au 20 juin 2026 ont fluctué entre 21.8 mm en douze jours de pluies à Zitenga (Bassitenga) à 461,4 mm en vingt-six (26) jours à Loropéni (Poni).




Figure 1 : Cumul pluviométrique décadaire

LEGENDE

Températures maximales observées en °C



Comparés avec la moyenne décennale (1991-2020), les cumuls pluviométriques de cette décade se sont révélés globalement déficitaires sur la majeure partie du territoire avec toutefois des excédents dans les localités Est, Sud-ouest et Ouest du pays (figure 3).

LEGENDE

Températures maximales observées en °C



Figure 3 : Anomalie du cumul pluviométrique par rapport à la moyenne 1991-2020

02 Situation agrométéorologique

Évolution de la température moyenne

Températures moyennes sous abri entre 27 °C à **Toussiana** (Houet) et 32,6 °C à **Dori** (Séno). Comparée à la décade précédente, une baisse modérée à importante des températures a été observée sur la majeure partie du pays (figure 4).




Figure 4 : Anomalie des températures moyennes par rapport à la décade précédente

Évolution de l'humidité relative moyenne

Les humidités relatives moyennes sous abri ont varié entre 57 % à Titao (Loroum) et 88 % à Ziou (Zoundwéogo). Comparée à la décade précédente, une hausse modérée à importante de l'humidité a été observée sur l'ensemble du pays (figure 5).




Figure 5 : Anomalie des humidités moyennes par rapport à la décade précédente

Suivi de la végétation

La croissance végétative est globalement similaire à légèrement en hausse sur la majeure partie du territoire par rapport à la moyenne 2003-2022, avec cependant de légères baisses sur des localités des régions du Nando, du Nazinon, du Nakambé, du Guiriko, du Goulmou, de la Tapoa, du Bankui et du Djôrô (figure 6).



Figure 6 : Anomalie NDVI de la décade par rapport à la décade précédente

03 Perspectives agrométéorologiques

Conditions météorologiques des prochains jours

Ciel en général nuageux à très nuageux, avec des orages et des pluies isolés par moments. Des manifestations orageuses et pluvieuses pourraient évoluer sur la majeure partie du territoire. Les quantités de pluie attendues pourraient atteindre ou dépasser 50 mm dans certaines localités. Températures : minimales moyennes entre 22 °C et 30 °C ; maximales moyennes entre 32 °C et 40 °C.

Carte des cumuls prévus

Figure 7 : Cumuls pluviométriques prévus (Source NOAA GFS)

Selon les résultats de la prévision saisonnière

Démarrage de la saison : tardif dans plusieurs zones de la moitié Sud du pays ; proche de la normale dans la moitié Nord du territoire.

Pluviométrie JJA (Juin-Juillet-Août) : normale à déficitaire sur la majeure partie du pays ; déficitaire à tendance normale sur le Sud de certaines régions.

04 Avis et Conseils agrométéorologiques

Au regard des conditions météorologiques observées et celles prévues pour les prochains jours il est nécessaire de prendre les dispositions nécessaires :

- Poursuivre et accélérer les labours et semis dans les régions du **Djôrô, des Tannounyan, du Guiriko, du Nazinon, du Bankui, du Nakambé, du Goulmou, de la Tapoa, des Koulsé, du Nando et de Oubri.**
- Commencer ou poursuivre les labours et semis dans les régions de la **Sirba, du Sourou, du Yaadga.**
- Profiter des conditions humides prévues pour accélérer et achever la **préparation des champs.**
- Apporter de la fumure organique dans les champs pour améliorer la fertilité du sol.
- Surveiller les cultures qui seraient déjà en phase de levée dans plusieurs localités du pays, afin de détecter précocement les risques d'attaque sur les premiers semis.
- Utiliser des semences bien adaptées au regard des prévisions saisonnières
- Utiliser les techniques de conservation de l'eau et de l'humidité pour faire face aux déficits pluviométriques prévus.
- Protéger tout bien sensible à l'humidité des **pluies prévues.**
- Pendant les orages : ne pas s'abriter sous les arbres, ni s'approcher des pylônes électriques (risque de foudre).
- Suivre les prévisions météorologiques quotidiennes ainsi que les alertes météorologiques pour planifier les activités.
- Prendre conseils également avec les services techniques de l'agriculture et veiller à l'utilisation des semences saines où à les traiter.

